Fontes

Double coating nurtures seeds, cen.acs.org/food/agriculture/Double-coating-nurtures-seeds/99/i26 (acedido em 20/12/2021).

A. T. Zvinavashe, J. Laurent, M. Mhada, H. Sun, H. M. E. Fouda, D. Kim, S. Mouhib, L. Kouisni, B. Marelli, *Nat. Food* **2021**, 2, 485-493. DOI: 10.1038/s43016-021-00315-8.

>

Ana Paula Esteves

aesteves@quimica.uminho.pt

A Velocidade de Amadurecimento das Uvas Pode Influenciar o Aroma do Vinho

As características das uvas são fortemente influenciadas pelo meio ambiente das vinhas, podendo as alterações climáticas afetar a qualidade das uvas e do vinho. Por exemplo, ondas de calor e secas podem levar a um amadurecimento precoce. À medida que amadurecem, ocorre a acumulação de açúcares, compostos fenólicos e compostos voláteis que originam alterações no perfil da composição química da uva e, conseqüentemente, influenciam o aroma do vinho, um dos aspetos essenciais para a obtenção de um vinho com qualidade. Para contrariar os efeitos negativos das mudanças climáticas na qualidade do vinho, investigadores têm estudado o modo de controlar o processo de amadurecimento das uvas.

Christopher M. Ford (Universidade de Adelaide e *Australian Research Council Training Center for Innovative Wine Production*, Glen Osmond, Austrália) e colegas investigaram como as condições de crescimento das uvas afetam a acumulação de açúcar e a produção de metabolitos secundários, os quais influenciam o aroma do vinho resultante. Estes investigadores cultivaram uvas da casta *Cabernet Sauvignon* numa vinha na Califórnia, EUA. Foi feita uma monda em verde em algumas videiras de modo a reduzir a produção e outras foram irrigadas durante a fase mais tardia do crescimento. Neste estudo, como controlo, algumas uvas cresceram sob condições padrão. Esta equipa recolheu uvas ao longo do período de amadurecimento e determinou o seu teor de açúcar. Os compostos voláteis foram analisados por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa (GC-MS).

Os resultados mostraram que as uvas de plantas com menos cachos registaram um aumento mais rápido no teor de açúcar e amadureceram mais cedo. As plantas que foram mais regadas apresentaram uma menor velocidade de formação de açúcar nas uvas. Estes investigadores verificaram que desacelerar o amadurecimento da uva diminuiu o conteúdo de, por exemplo, aldeídos e álcoois com

seis átomos de carbono na cadeia, bem como de 2-isobutil-3-metoxipirazina, composto que está associado às notas características de pimento verde nos vinhos feitos com *Cabernet Sauvignon*. Por sua vez, o amadurecimento mais lento conduziu ao aumento de norisoprenóides e terpenos, que são associados a notas florais e frutadas. Assim, um tempo de crescimento mais longo melhora a qualidade das uvas para vinificação. De acordo com a equipa de investigação, o trabalho precisa ser replicado em várias colheitas para determinar os efeitos de longo prazo da aplicação destas práticas nas mesmas vinhas.

Fontes

Ripening speed of grapes can influence wine taste, chemistryviews.org/details/news/11310824/Ripening_Speed_of_Grapes_Can_Influence_Wine_Taste.html (acedido em 25/10/2021).

P. Previtali, N. K. Dokoozlian, B. S. Pan, K. L. Wilkinson, C. M. Ford, *J. Agric. Food Chem.* **2021**, 69, 7709-7724. DOI: 10.1021/acs.jafc.1c01229.

Crédito: ChemistryViews

>

Ana Paula Esteves

aesteves@quimica.uminho.pt